

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, DE PUESTOS DE TRABAJO DE FEA EN DERMATOLOGIA

PRIMERA PRUEBA

- 1.- Mecanismo de acción e Indicaciones del Imatinib Mesilato (Glivec) en Dermatología.
- 2.- Fenómeno de Kasabach-Merrit: ¿en qué consiste?, ¿con qué se asocia? y ¿cómo se trata?
- 3.- Criterios diagnósticos para el síndrome de Sweet clásico. Criterios necesarios para el diagnóstico.
- 4.-Tipos de queratoacantoma (variantes)
- 5.- Manifestaciones cutáneas de la esclerosis tuberosa
- 6.- Criterios desmatoscópicos del carcinoma basocelular
- 7.- Clasificación y patrón de transmisión de las ictiosis hereditarias
- 8.- Criterios diagnósticos y tratamiento de la Enfermedad de Kawasaki

CASO 1

Mujer de 28 años afecta de malformación vascular en cuello y cavidad oral. Acude para valoración y tratamiento de lesión ulcerada dolorosa localizada en punta lingual de aproximadamente un mes de evolución que no cicatriza con tratamientos tópicos. Se realiza biopsia punch que se estudia con hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica para CD31.

Caso II

Mujer de 14 años con piel tipo II que presenta de siempre múltiples lunares.

Desde el verano el lunar localizado en nalga derecha ha aumentado de tamaño y sangrado en varias ocasiones.

Exploración:

Región glútea derecha, tumoración de 2,5 x 2 cm. globulosa de color negro rojizo oscuro, de base ligeramente pediculada y superficie lisa brillante con erosiones. Rodea la lesión un halo pardo irregular.

AP yAF sin interés dermatológico

Exploraciones complementarias:

Analítica de sangre: normal

Radiografía de tórax : dentro de la normalidad

Histología:

CASO 3

- Varón de 60 años
- Sin antecedentes de interés
- Refiere lesiones cutáneas en cara y cuello desde la juventud
- No recuerda antecedentes familiares similares
- Estudio genético: mutación en el gen FLCN